

de todo un poco

La fiebre y su tratamiento (y II)

Este cuadro forma parte del artículo *La Fiebre y su tratamiento* que publicamos en el n° 12 de la revista Múltiples (invierno 2004). Por problemas de maquetación no lo pudimos incluir entonces.

Cómo usar la tabla

● No existe dosificación para bebés menores de un

mes, porque a esta edad debe acudir inmediatamente al pediatra o al Servicio de Urgencias.

● La tabla está dividida en tramos horizontales según la edad del niño. Dentro de estos tramos de edad existe también una subdivisión según el peso.

● Para saber la dosis de antitérmicos que debe admi-

nistrar a su hijo, primero, localice el tramo de edad; segundo, localice el peso correspondiente a su edad; si el peso de su hijo no concuerda exactamente con las dos posibilidades de peso y sus dosificaciones, suba o baje de tramo y localice un peso acorde con el de su hijo. Use la dosis que vaya de acuerdo con el peso de su

hijo, aunque no le corresponda por la edad. Dé preferencia al peso y no a la edad a la hora de elegir la dosis.

● Ve a las dosis de paracetamol e ibuprofeno. Todas las cantidades indicadas para esos pesos están calculadas según las dosis medias para estos antitérmicos y deberá utilizarlas cada 6 horas (paracetamol) o cada 6-8 horas (ibuprofeno).■

Sofía San Juan, pediatra.

Dosificación de antitérmicos (por edad y peso del niño)

EDAD	KILOS	PARACETAMOL Gotas: 1 cc.=100 mg.	IBUPROFENO Jarabe: 5 cc. = 100 mg.	A.A.S. Aspirina	METAMIZOL Nolotil
1-3 mes	2,5/4,5	40 mg.= 0,4 cc..	No recomendado	No recomendado	No recomendado
	4,5	70 mg.=0,7 cc.	No recomendado	No recomendado	No recomendado
	6,5	90 mg.=0,9 cc.	No recomendado	No recomendado	No recomendado
3-6 mes	6,5	90 mg.=0,9 cc.	No recomendado	No recomendado	No recomendado
	8	120 mg.=1,2 cc. Febrectal lactantes supositorios	No recomendado	No recomendado	No recomendado
6-12 mes	8	120 mg.=1,2 cc.	40-60 mg.=2-3 cc.	No recomendado	No recomendado
	10	150 mg.=1,5 cc. Febrectal lactantes supositorios	50-70mg.=2,5-3,5 cc.	No recomendado	No recomendado
12,18	10	150 mg.= 1,5 cc.	50-70mg.=2,5-3,5 cc.	No recomendado	No recomendado
ó 24 mes	13	200 mg.= 2 cc. Febrectal lactantes supositorios Melabón infantil supositorios	70-90 mg.=3,5-4,5 cc.	No recomendado	No recomendado
2-4 años	13	200 mg.= 2 cc.	70-90 mg.=3,5-4,5 cc.	No recomendado	No recomendado
	17	260 mg.= 2,6 cc. Melabón infantil supositorios	90-120 mg.=4,5-6 cc.	No recomendado	No recomendado
4-7 años	17	260 mg.= 2,6 cc.	90-120 mg.=4,5-6 cc.	No recomendado	No recomendado
	24	340 mg.= 3,4 cc. Melabón infantil supositorios Febrectal infantil supositorios	120-160 mg.= 6-8 cc.	No recomendado	Nolotil supositorios infantil
7-10 años	24	340 mg.= 3,4 cc.	120-160 mg.= 6-8 cc.	No recomendado	Nolotil supositorios infantil
	32	480 mg.= 4,8 cc. Febrectal infantil supositorios Febrectal adultos supositorios Paracetamol compr. 500 mg.	160-200mg.=8-10cc. 1 comp. 200mg.	No recomendado o prescripción facultativa	Nolotil supositorios infantil
10-12 años	32-40	480-600mg.=4,8-6cc	200-240mg.=10-12cc	Prescripción facultativa	1 supositorio infantil
	48	Paracetamol compr. 500 mg.	15cc, 1y1/2 comp	Prescripción Facultativa	1 cápsula
Adolescente	más 50 k	600 mgs ó 650 mgs. Paracetamol compr. 650 mgs.	2 comp 200mg, 1 comp de 400 mg.	1 aspirina adultos	1 cápsula